

Szili István: mobil:+36-30-921-3388 cím 2146 Mogyoród Szántó u. 2.

II. PECSÉTVIASZGOMBA (ELTÉRÉSEK A LASKAGOMBÁTÓL)

A Távol-Keleten sterilizett aljzaton termesztik. Kísérletileg megpróbálkozhatunk a laskagombánál ismertetett eljárásokkal (száraz gőzölés, merítés). Az alapanyag tartalmazzon 30-50% fűrészport-forgácsot. A csíramennyiség a laska duplája legyen. 3-5 kg-os zsákokat készítsünk csak, perforációkkal.

Padozaton, polcokon is termeszthetjük álló vagy fekvő helyzetben (így egymásra is rakhatjuk). Az átszövődött blokkokat kertben árnyékos, szélvédett helyen a talajba is beáshatjuk néhány cm talajtakarással, lombtakarással. Helyiségben termesztve legalább 23-25 °C-ot biztosítsunk termésidő alatt is. Átszövés alatt (30-40 nap) sötét legyen. Termőre fordításkor (40-60. nap) a blokkok száját nyissuk ki teljesen, és hagyjuk így, hogy a blokk felszíne védve legyen a kiszáradástól, és biztosítsunk kb. 80%-os relatív páratartalmat például padozatlocsolással. Először csak a gomba szára növekszik, nyúlik, gyenge szellőztetés mellett. Amikor eléri a fólia szélét (8-10 cm), kissé emeljük a páratartalmat (85-95%), és fokozzuk a szellőztetést is (a kettő együtt nem is könnyű dolog). A több friss levegő hatására a kalap széle növekedni kezd, ami – taplógombáról lévén szó – 1-2 hónapig eltart. Amikor a kalap széléről eltűnik az élénk szín, akkor szedésre érett. A második terméshullámot is érdemes megvárni, az is ilyen hosszú.

Szedés után daraboljuk fel az egész gombát, majd így szárítsuk meg. Teljes szárítás után kell megdarálni, ami nem könnyű feladat: nem igazi gombaport kapunk (szálas, vattaszerű örleménye van). Szárításkor a nedvességtartalmat 13% alá kell vinni, nehogy később megpenészedjen. A gombaőrleményt leginkább teaként (és C-vitaminnal együtt) célszerű fogyasztani, bár ajánlják pl. kefirbe keverten is.

Mogyoród, 2017. május

Szili István
(+36-309213388)